

Presidente

Ettore Beghi
Istituto Mario Negri
Via La Masa, 19
20156 Milano

Past President

Paolo Tinuper

Segretario

Giuseppe Capovilla
U.O. Neuropsichiatria Infantile
Ospedale Carlo Poma
Viale Albertoni, 1
46100 Mantova

Consiglieri

Umberto Aguglia
Stefano Francione
Anna Teresa Giallonardo
Oriano Mecarelli
Gian Carlo Muscas
Dario Pruna
Antonino Romeo
Vito Sofia

Revisori dei Conti

Antonio Gambardella
Tiziana Granata
Angela La Neve

Segreteria

Maura Stella
c/o PTS Congressi srl
Via Nizza, 45
00198 Roma
Tel. 06 85355590
333 4727869
Fax 06 85356060
Segreteria.Lice@ptsroma.it
Maura.Stella@ptsroma.it



Milano, 24 Luglio 2008

Recentemente alcuni organi di stampa e siti web hanno riportato una notizia proveniente dalla Food and Drug Administration (FDA), l'agenzia che regola l'immissione e l'uso dei farmaci sul mercato americano, in base alla quale, tra i soggetti trattati con farmaci antiepilettici, 4 su 1000 hanno un rischio di manifestare idee suicidarie. Il rischio è massimo nella settimana successiva all'inizio del trattamento.

La LICE (Lega Italiana contro l'Epilessia), cioè la società scientifica che raccoglie in Italia gli specialisti che si occupano dei pazienti con epilessia, intende fare alcune precisazioni allo scopo di inserire la notizia in un contesto più ampio e corretto, onde evitare inutili allarmismi.

Il dato ha suscitato non poche perplessità fra gli specialisti del settore perché derivato da uno studio effettuato su gruppi di pazienti non rappresentativi dei casi di epilessia presenti nella popolazione e in terapia con undici differenti farmaci antiepilettici. Inoltre, la raccolta dei dati è stata effettuata senza tenere in considerazione il contesto sociale e psicologico dei singoli pazienti, le modalità di trattamento (in particolare l'associazione con altri farmaci) e, in generale, di molti altri fattori che possono influire sugli effetti della terapia e sulla risposta del paziente.

Si raccomanda quindi ai pazienti ed ai loro famigliari di non modificare o sospendere spontaneamente la propria terapia, situazione che può generare rischi di crisi ma, in caso di disturbi, di ricorrere agli specialisti che li hanno in cura.

Si ricorda che in Italia esistono su tutto il territorio nazionale centri ed ambulatori specializzati per la diagnosi e la cura dell'epilessia, dove operano medici esperti in epilessia in grado di prevenire e gestire gli effetti collaterali od indesiderati dei farmaci antiepilettici.

La LICE si impegna inoltre a monitorare l'evoluzione delle conoscenze scientifiche che riguardano questo argomento ed a darne pronta diffusione.

Prof. Ettore Beghi
Presidente Lega Italiana Contro l'Epilessia